

NOUVEAU &  
DISPONIBLE



**UrgoStart plus**<sup>Border</sup> est un traitement innovant qui permet de réduire de 100 jours le temps de cicatrisation dès le début et jusqu'à cicatrisation complète.<sup>(1)</sup>

**UrgoStart plus**<sup>Border</sup> est indiqué dans les ulcères de jambes, les plaies du pied diabétique et les escarres, quelle que soit la phase de cicatrisation\*. Il est disponible dès maintenant en pharmacie et est 100% remboursable\*\*.

Dès le début

jusqu'à cicatrisation complète

#### SIMPLICITÉ

Adapté à toutes les phases de la cicatrisation\*, dès le début

#### EFFICACITÉ

Réduit le temps de cicatrisation de 100 jours<sup>(1)</sup>



Absorption forte



Imperméable à l'eau



Utilisable sous compression



Ne pas confondre les produits de la gamme **UrgoStart** (UrgoStart, UrgoStart Border & UrgoStart Interface) qui restent disponibles et **UrgoStart plus**<sup>Border</sup>



Taille	Taille compresse	Boîte	Code ACL
8x8 cm	4,5x4,5 cm	16	35468.900.000.67
13x13 cm	8,3x8,4 cm	16	35468.900.000.74
15x20 cm	9,7x14,7 cm	16	35468.900.000.81
20x20 cm	12,6x14,3 cm	16	35468.900.000.98



#### Comment prescrire ?

- Ecrire « **UrgoStart Plus Border** » en toutes lettres
- Indiquer la taille souhaitée
- Indiquer le nombre de boîtes
- Indiquer la fréquence de renouvellement
- Vous pouvez rajouter « Non substituable »

\*Hors nécrose sèche

(1) Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153

\*\*Gamme UrgoStart Plus et UrgoStart : Dispositifs Médicaux de classe IIb (G-Med). Traitement pour réduire le temps de cicatrisation.

Intégralement remboursables LPPR (Sec. Soc. : 60% +Mutuelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).

Lire attentivement la notice avant utilisation en particulier en ce qui concerne les précautions d'emploi et les contre-indications