

## Annexes - Résultats complets nationaux

### 1. Indicateurs cliniques pour les médecins traitants (libéraux)

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Résultats à fin déc. 2022	Evol. en points 2021 - 2022
<b>Grippe</b>									
Vaccination antigrippale des 65 ans et plus	52,9%	52,9%	55,3%	56,4%	64,2%	61,2%	60,1%	-1,1	
Vaccination antigrippale du sujet à risque	31,2%	31,2%	33,3%	34,9%	40,9%	37,0%	33,6%	-3,5	
<b>Dépistage des cancers</b>									
Dépistage du cancer du sein	67,3%	66,1%	66,4%	66,2%	63,2%	63,4%	64,6%	1,2	
Dépistage du cancer du col	56,9%	56,8%	56,1%	55,0%	53,4%	53,7%	54,6%	0,9	
Dépistage du cancer colorectal	22,9%	29,1%	28,1%	30,8%	30,5%	34,3%	35,6%	1,4	
<b>Iatrogénie médicamenteuse</b>									
Patient âgé sous psychotropes	5,3%	5,0%	4,8%	4,6%	4,5%	4,4%	4,3%	-0,1	
Traitement par benzodiazépine hypnotique	41,6%	40,9%	42,4%	41,0%	42,9%	43,7%	43,2%	-0,5	
Traitement par benzodiazépine anxiolytique	15,1%	15,0%	14,8%	14,3%	15,0%	15,2%	14,4%	-0,8	
<b>Antibiothérapie</b>									
Antibiothérapie des 16-65 ans sans ALD	39,5	36,1	35,8	32,9	24,3	23,3	27,2	3,8	
Antibiorésistance	43,2%	39,5%	36,9%	34,7%	34,7%	34,4%	33,2%	-1,1	
<b>Diabète</b>									
Nombre de dosages HbA1c chez le diabétique	79,0%	78,7%	79,4%	79,7%	76,9%	78,9%	78,4%	-0,5	
Fond d'œil chez le diabétique	62,9%	62,0%	65,8%	68,1%	67,0%	67,0%	68,6%	1,6	
Dépistage maladie rénale chronique chez le diabétique	31,0%	34,9%	40,9%	43,4%	42,5%	42,2%	43,3%	1,1	
<b>HTA</b>									
Dépistage maladie rénale chronique chez l'hypertendu	7,0%	9,0%	22,3%	24,8%	24,6%	25,4%	27,4%	1,9	
<b>Risque cardio-vasculaire</b>									
Prévention secondaire du risque cardio-vasculaire	44,2%	43,6%	43,7%	43,9%	44,1%	44,9%	45,8%	0,8	
Surveillance d'un traitement par anti vitamine K	79,0%	80,2%	85,5%	84,1%	80,4%	79,8%	77,5%	-2,3	
<b>Prescription dans le répertoire (ou bio-similaires)</b>									
Statine dans le répertoire des génériques	90,3%	90,7%	98,1%	97,0%	95,4%	93,5%	90,8%	-2,7	
Antihypertenseur dans le répertoire des génériques	86,5%	88,5%	92,7%	95,3%	93,3%	94,7%	95,8%	1,1	
TraITEMENT DE L'INCONTINENCE URINAIRE DANS LE RÉPERTOIRE DES GÉNÉRIQUES	47,1%								
TraITEMENT DE L'ASTHME DANS LE RÉPERTOIRE DES GÉNÉRIQUES	78,9%								
Autres traITEMENTS DANS LE RÉPERTOIRE DES GÉNÉRIQUES	47,1%	62,2%	62,3%	64,7%	61,0%	59,8%	65,6%	5,7	
Biosimilaires de l'insuline glargin	0,2%	2,8%	9,1%	19,7%	26,8%	32,6%	38,6%	6,0	
<b>Indicateurs neutralisés</b>									
<b>Efficience des prescriptions</b>									
TraITEMENT PAR INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS			30,9%	30,1%	30,8%	32,6%	30,8%	-1,8	
TraITEMENT PAR ÉZÉTIMIBE			11,0%	12,0%	13,5%	15,4%	18,2%	2,8	
TraITEMENT ANTIAGRÉGANT PLAQUETTAIRE PAR ASPIRINE	87,2%	87,9%	88,4%	88,9%	89,2%	89,7%	90,2%	0,5	
TraITEMENT PAR METFORMINE CHEZ LE DIABÉTIQUE DE TYPE 2	80,6%	81,4%	82,3%	83,0%	83,6%	83,6%	81,8%	-1,8	
Hormonémies thyroïdiennes	86,7%	89,1%	90,7%	91,0%	91,1%	91,0%	90,9%	-0,1	
Décaissement									

## 2. Indicateurs cliniques pour les médecins traitants adultes (centres de santé)

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Résultats à fin déc. 2022	Evol. en points 2021 - 2022
<b>Grippe</b>									
Vaccination antigrippale des 65 ans et plus	40,1%	40,2%	42,3%	43,9%	50,1%	49,4%	50,3%	0,8	
Vaccination antigrippale du sujet à risque	26,4%	26,7%	29,2%	31,3%	36,1%	33,2%	31,0%	-2,2	
<b>Dépistage des cancers</b>									
Dépistage du cancer du sein	61,1%	59,9%	59,9%	60,2%	57,8%	58,3%	59,8%	1,5	
Dépistage du cancer du col	50,2%	49,8%	48,9%	47,8%	46,1%	45,7%	48,1%	2,4	
Dépistage du cancer colorectal	17,1%	23,7%	23,7%	24,5%	24,9%	28,8%	30,6%	1,8	
<b>Iatrogénie médicamenteuse</b>									
Patient âgé sous psychotropes	3,0%	2,9%	2,9%	2,7%	2,7%	2,8%	2,9%	0,1	
Traitements par benzodiazépine hypnotique	39,7%	39,1%	41,9%	41,4%	43,4%	43,9%	43,8%	-0,1	
Traitements par benzodiazépine anxiolytique	13,1%	13,8%	14,0%	13,7%	14,7%	15,4%	14,9%	-0,6	
<b>Antibiothérapie</b>									
Antibiothérapie des 16-65 ans sans ALD	26,7	24,2	23,6	21,6	15,4	14,2	15,7	1,5	
Antibiorésistance	37,6%	36,7%	35,4%	34,2%	33,4%	32,7%	32,8%	0,1	
<b>Diabète</b>									
Nombre de dosages HbA1c chez le diabétique	71,1%	71,2%	72,4%	73,2%	70,5%	74,0%	74,9%	0,9	
Fond d'œil chez le diabétique	65,8%	62,2%	66,9%	70,1%	69,7%	71,0%	72,6%	1,6	
Dépistage maladie rénale chronique chez le diabétique	41,0%	41,8%	43,2%	44,9%	44,2%	43,7%	44,5%	0,7	
<b>HTA</b>									
Dépistage maladie rénale chronique chez l'hypertendu	12,0%	12,3%	27,1%	28,0%	27,2%	27,8%	28,5%	0,7	
<b>Risque cardio-vasculaire</b>									
Prévention secondaire du risque cardio-vasculaire	38,5%	38,2%	38,9%	39,9%	39,7%	41,9%	43,3%	1,4	
Surveillance d'un traitement par anti vitamine K	63,1%	68,4%	74,8%	74,3%	74,1%	75,1%	75,5%	0,4	
<b>Prescription dans le répertoire (ou bio-similaires)</b>									
Statine dans le répertoire des génériques	92,5%	92,6%	98,2%	97,3%	95,7%	94,0%	91,6%	-2,3	
Antihypertenseur dans le répertoire des génériques	85,7%	87,7%	92,6%	95,1%	92,9%	94,6%	96,1%	1,5	
Traitement de l'incontinence urinaire dans le répertoire des génériques	44,4%								
Indicateurs neutralisés									
Traitement de l'asthme dans le répertoire des génériques	71,1%								
Autres traitements dans le répertoire des génériques	44,4%	62,1%	62,4%	65,2%	62,2%	61,4%	65,9%	4,5	
Biosimilaires de l'insuline glargin	0,3%	2,6%	6,4%	14,2%	21,5%	27,2%	33,1%	5,9	
<b>Efficience des prescriptions</b>									
Traitement par inhibiteurs de la pompe à protons			36,0%	35,7%	35,6%	37,0%	36,6%	-0,3	
Traitement par ezétimibe			8,8%	9,9%	11,4%	13,6%	16,3%	2,7	
Traitement antiagrégant plaquetttaire par aspirine	88,2%	89,0%	89,2%	89,5%	90,0%	90,5%	90,6%	0,0	
Traitement par metformine chez le diabétique de type 2	87,5%	87,5%	87,7%	87,9%	88,2%	87,5%	85,5%	-2,0	
Hormonémies thyroïdiennes	78,0%	80,2%	82,6%	84,6%	85,8%	86,0%	86,3%	0,3	
Décrevants									
SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES									
OPTIMISATION ET EFFICIENCE DES PRESCRIPTIONS									

## 3. Indicateurs cliniques pour les cardiologues

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Résultats à fin déc. 2022	Evol. en points 2021 - 2022
<b>HTA</b>									
Hypertension artérielle sous trithérapie	68,1%	68,3%	68,5%	69,6%	70,6%	70,9%	71,1%	0,1	
Surveillance biologique sous trithérapie anti-HTA	89,4%	90,0%	90,4%	91,4%	91,2%	92,2%	92,8%	0,6	
<b>Iatrogénie</b>									
Limiter la durée des traitements antiagrégants	67,9%	66,6%	65,1%	63,3%	61,3%	61,1%	58,8%	-2,4	
<b>Infarctus du myocarde</b>									
Traitement post infarctus du myocarde	34,2%	33,5%	32,2%	32,0%	32,4%	32,4%	32,9%	0,5	
<b>Insuffisance cardiaque</b>									
Traitement de l'insuffisance cardiaque	63,4%	63,4%	64,1%	65,8%	66,5%	67,3%	68,0%	0,6	
<b>Prescription dans le répertoire</b>									
Antihypertenseurs génériques	86,1%	90,9%	93,3%	92,6%	91,8%	92,6%	93,2%	0,6	
Statines génériques	91,2%	95,0%	93,8%	89,9%	84,7%	80,0%	73,7%	-6,4	
Dec									
SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES									
EFF. PRESC. RÉP. TION									

## 4. Indicateurs cliniques pour les gastro-entérologues

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Résultats à fin déc. 2022	Evol. en points 2021 - 2022
<b>Dépistage du cancer colorectal</b>									
Coloscopie totale avec polypectomie	3,1%	3,7%	3,6%	3,6%	3,5%	3,2%	3,5%	0,3	
<b>Eradication Helicobacter Pylori</b>									
Contrôle d'éradication d'Helicobacter Pylori	58,9%	61,3%	63,1%	63,5%	57,1%	64,1%	64,4%	0,4	
<b>Cancer colorectal</b>									
Imagerie après intervention pour cancer colorectal	73,5%	74,9%	77,3%	79,1%	78,7%	80,5%	81,7%	1,2	
ACE après intervention pour cancer colorectal	27,4%	27,2%	27,2%	28,0%	27,9%	28,8%	29,5%	0,6	
<b>MICI</b>									
Protéinurie pour MICI sous 5-ASA	38,4%	38,8%	39,7%	41,0%	39,9%	41,9%	43,5%	1,6	
NFS-plaquettes pour MICI sous azathioprine	71,2%	70,7%	70,2%	70,8%	67,2%	69,6%	68,0%	-1,6	
Dec									
PREVENTION									
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES									

## 5. Indicateurs cliniques pour les endocrinologues

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Résultats à fin déc. 2022	Evol. en points 2021 - 2022
<b>Diabète</b>									
PRE VEN TIO N	Soins de podologie chez le diabétique	51,0%	51,9%	52,9%	50,0%	55,0%	57,9%	2,9	
<b>Diabète</b>									
SU VI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Diabétiques de moins de 70 ans traités par insulinothérapie « basal bolus »	88,6%	85,6%	79,6%	89,2%	88,1%	85,6%	-2,5	
<b>Thyroïde</b>									
EFF. PRESCRIPTI ONS	Dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline	69,5%	70,3%	72,3%	71,2%	71,6%	72,9%	1,3	
	Cytoponction avant opération d'un nodule thyroïdien	48,4%	50,0%	54,5%	57,9%	56,9%	58,9%	2,0	
<b>Diabète</b>									
	Autonomisation du diabétique de moins de 80 ans en initiation par l'insuline	69,5%	70,6%	70,4%	69,0%	67,1%	68,5%	1,5	
	Initiation par l'insuline à l'hôpital chez le diabétique de moins de 80 ans	26,0%	23,9%	22,9%	20,8%	20,5%	20,1%	-0,4	Dec.

## 6. Indicateurs cliniques pour les médecins traitants de l'enfant (libéraux)

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Résultats à fin déc. 2022	Evol. en points 2021 - 2022
<b>Vaccination</b>									
PREVENTION	2 doses vaccin ROR chez enfants de - 2 ans	75,7%	78,1%	83,1%	84,3%	85,9%	87,0%	86,3%	-0,7
	1 dose vaccin antimeningocoque C enfants - 18 mois	75,3%	80,5%	89,2%	95,1%	97,4%	98,0%	98,2%	0,2
<b>Antibiorésistance</b>									
SU VI PATHO - CHRO	Part des C3 ou C4 des enfants de - 4 ans traités par antibiotiques	34,0%	27,0%	24,1%	21,3%	20,1%	20,5%	22,1%	1,7
	Part des C3 ou C4 des enfants de + 4 ans traités par antibiotiques	22,8%	19,3%	17,2%	15,2%	14,1%	14,6%	14,9%	0,3
<b>Suivi bucco-dentaire</b>									
	Examen bucco-dentaire chez les - 16 ans	76,5%	76,9%	76,9%	77,4%	71,9%	74,1%	74,1%	0,0
<b>Asthme</b>									
	Asthme persistant [1-16 ans] traités par CI ou ALT	54,8%	54,1%	53,0%	53,9%	55,5%	50,9%	49,2%	-1,7
	Asthme persistant [6-16 ans] avec au moins 1 EFR/an	38,4%	39,8%	43,3%	43,2%	41,3%	42,8%	40,8%	-2,0
									Dec.