

EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel - COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Adapalène : 3 mg (0,3 %), Peroxyde de benzoyle : 25 mg (2,5 %) pour 1 g de gel. Excipient à effet notoire : propylène glycol (E1520) 40 mg (4,0%) dans 1 g de gel. Excipients : Edéate disodique, docusate sodique, glycérol, poloxamère, propylèneglycol (E1520), SIMULGEL 600PHA (copolymère d'acrylamide et d'acryloyldiméthyltaurate de sodium, isohexadécane, polysorbate 80, oléate de sorbitan), eau purifiée.

FORME PHARMACEUTIQUE : Gel opaque de couleur blanche à jaune très pâle. **DONNEES CLINIQUES - Indications thérapeutiques :** EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel est indiqué dans le traitement cutané de l'acné vulgaire en présence de comédons et de nombreuses papules et pustules (voir rubriques « Posologie et mode d'administration » et « Propriétés pharmacodynamiques ») - **Posologie et mode d'administration :**

Posologie : EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel doit être appliquée une fois par jour, le soir, sur l'ensemble des zones affectées par l'acné du visage et du tronc, sur une peau nettoyée et séchée. La durée du traitement doit être déterminée par le prescripteur en fonction de l'état clinique global et de la réponse thérapeutique au traitement. Les premiers signes d'amélioration clinique apparaissent généralement après 1 à 4 semaines de traitement. Si aucune amélioration n'est observée après 4 à 8 semaines de traitement, l'intérêt de la poursuite du traitement doit être réévalué. Un dosage plus faible d'EPIDUO est disponible (EPIDUO 0,1% / 2,5% gel) et ce dosage doit être envisagé chez les patients atteint d'acné vulgaire modérée (voir rubrique « Propriétés pharmacodynamiques »). Lorsque l'ensemble du visage est atteint par de nombreuses papulopustules, un bénéfice clinique plus élevé a été observé chez les patients traités avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel par rapport au traitement de référence (EPIDUO 0,1% / 2,5% gel). Le prescripteur peut choisir entre les deux dosages en fonction de l'atteinte et de la gravité clinique du patient. Populations particulières : *Personnes âgées* : La sécurité et l'efficacité d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel chez les patients âgés de 65 ans et plus n'ont pas été établies. *Personnes souffrant d'insuffisance rénale ou hépatique* : EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel n'a pas été étudié chez les patients présentant une insuffisance rénale et hépatique. *Population pédiatrique* : La sécurité et l'efficacité d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été étudiées.

Mode d'administration : Voie cutanée uniquement. Appliquer une fine couche d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel sur les zones atteintes du visage et / ou du tronc une fois par jour sur une peau nettoyée. Une quantité de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque zone du visage (par exemple le front, le menton, chaque joue), en évitant les yeux et les lèvres (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »). Les patients doivent être informés de se laver les mains après l'application du médicament. Des cosmétiques peuvent être appliqués une fois que le gel EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel ait séché. En cas d'irritation, il doit être recommandé au patient d'appliquer un produit hydratant non comédogène, d'utiliser le médicament moins fréquemment (par exemple tous les 2 jours), de suspendre temporairement le traitement ou de l'arrêter définitivement - **Contre-indications** : Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients - **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi** :

EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel ne doit pas être appliquée sur une peau abimée, une peau lésée (coupures ou écorchures), une peau souffrant d'érythème solaire ou une peau eczémateuse. Le médicament ne doit pas entrer en contact avec les yeux, les lèvres, la bouche, les narines ou les muqueuses. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau tiède. Si une réaction suggérant une sensibilité à l'un des composants apparaît, l'utilisation d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel doit être interrompue. L'exposition excessive au soleil ou aux lampes à ultraviolets doit être évitée. EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel ne doit pas entrer en contact avec des matières colorées dont les cheveux et les fibres textiles teintées, en raison du risque de blanchiment et de décoloration. Le produit contient du propylèneglycol (E 1520) et peut provoquer des irritations cutanées. EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ni chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception adéquate (voir rubrique « Fertilité, grossesse et allaitement »). L'efficacité et la sécurité d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel chez les patients atteints d'acné nodulaire sévère ou d'acné nodulo-kystique n'ont pas été étudiées. Comme les patients souffrant d'acné nodulaire sévère ou nodulo-kystique sont à risque accru de cicatrices permanentes secondaires aux lésions d'acné, l'utilisation d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel chez ces patients n'est pas recommandée en raison du risque de réponse thérapeutique insuffisante - **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions** :

Aucune étude d'interaction n'a été réalisée avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel. D'après l'expérience précédente avec l'adapalène et le peroxyde de benzoyle, il n'existe pas d'interactions connues avec d'autres médicaments qui pourraient être utilisés par voie cutanée et simultanément avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel. Cependant, d'autres médicaments contenant des rétinoïdes, du peroxyde de benzoyle ou ayant un mode d'action similaire ne doivent pas être utilisés de manière concomitante. L'utilisation de produits cosmétiques desquamant, irritants ou desséchants doit être faite avec précaution, car elle peut entraîner une irritation supplémentaire avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel. L'absorption de l'adapalène à travers la peau humaine est faible (voir rubrique 5.2), et donc l'interaction avec un médicament pris par voie systémique est peu probable. La pénétration percutanée du peroxyde de benzoyle dans la peau est

faible, et la substance active est complètement métabolisée en acide benzoïque qui est rapidement éliminé. Par conséquent, l'interaction potentielle de l'acide benzoïque avec des médicaments systémiques est peu probable - **Fertilité, grossesse et allaitement** : EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel ne peut être donné aux femmes en âge de procréer que seulement si une contraception très efficace est utilisée pendant le traitement et jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement. **Grossesse** : Il n'y a pas ou peu de données sur l'utilisation de l'adapalène chez les femmes enceintes. Les études chez l'animal par voie orale ont montré une toxicité sur la reproduction à des doses systémiques élevées (voir rubrique « Données de sécurité préclinique »). L'expérience clinique avec l'adapalène et le peroxyde de benzoyle appliqués localement pendant la grossesse est limitée mais les quelques données disponibles ne montrent pas d'effets nocifs chez les patientes exposées en début de grossesse. En raison des données disponibles limitées et du fait qu'un faible passage cutané de l'adapalène est possible, EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et ne doit pas être utilisé chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception. En cas de grossesse inattendue, le traitement doit être arrêté. **Allaitement** : Aucune étude sur le passage dans le lait chez l'animal ou chez l'Homme n'a été conduite après application cutanée d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel. Les données pharmacocinétiques disponibles chez le rat ont mis en évidence l'excration de l'adapalène dans le lait après administration par voie orale ou intraveineuse d'adapalène. Un risque pour les enfants allaités ne peut être exclu. Une décision doit être prise soit d'interrompre l'allaitement soit d'interrompre / de s'abstenir du traitement par EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel en tenant compte du bénéfice de l'allaitement pour l'enfant et de celui du traitement pour la mère. Afin d'éviter une exposition du bébé, l'application d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel sur la poitrine de la mère doit être évitée durant l'allaitement. **Fertilité** : Aucune étude de fertilité humaine n'a été menée avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel. Cependant, aucun effet de l'adapalène ou du peroxyde de benzoyle sur la fertilité n'a été trouvé chez les rats dans les études de reproduction - **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines** : EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines - **Effets indésirables** : Résumé du profil de sécurité : Environ 10% des patients sont susceptibles de présenter des effets cutanés indésirables. Les effets indésirables liés au traitement habituellement associés à l'utilisation d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel sont des réactions légères à modérées au site d'application telles qu'irritation cutanée caractérisée principalement par desquamation, sécheresse, érythème, brûlure/picotements. Il est recommandé d'utiliser un produit hydratant, de réduire temporairement la fréquence d'application quotidienne à un jour sur 2, ou de cesser temporairement l'utilisation jusqu'à ce que l'application quotidienne puisse être reprise. Ces réactions se produisent généralement au début du traitement, et ont tendance à diminuer graduellement au cours du temps. Liste des effets indésirables : Les effets indésirables sont répertoriés par classe de systèmes d'organes et par fréquence en utilisant la convention suivante : très fréquent ($\geq 1/10$), fréquent ($\geq 1/100, < 1/10$), peu fréquent ($\geq 1/1\,000, < 1/100$), rare ($\geq 1/10\,000, < 1/1\,000$), très rare ($< 1/10\,000$), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Ces effets indésirables ont été rapportés avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel lors d'une étude clinique de phase 3 contrôlée versus véhicule. Affection oculaire : Peu fréquent : Erythème palpébral. Fréquence indéterminée* : Oedème palpébral. Affections du système immunitaire : Fréquence indéterminée* : Réaction anaphylactique. Affections du système nerveux : Peu fréquent : Paresthésie (picotements au site d'application). Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquence indéterminée* : Sensation de gorge serrée, dyspnée. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Dermatite atopique, eczéma, sensation de brûlure de la peau, irritation cutanée. Peu fréquent : Sécheresse cutanée, prurit, rash. Fréquence indéterminée* : Dermite de contact allergique, gonflement du visage, douleur de la peau (sensation de picotement), vésicules cutanées, décoloration de la peau (hyperpigmentation et hypopigmentation), urticaire. *Données de surveillance recueillies après la mise sur le marché d'EPIDUO 0,1% / 2,5%, gel à partir d'une population de taille inconnue. Les effets indésirables cutanés étaient plus fréquents avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel qu'avec EPIDUO 0,1% / 2,5%, gel par rapport au véhicule. Dans l'étude pivot (voir rubrique 5.1), 9,2% des patients dans la population combinée traitée avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel avaient des effets indésirables cutanés liés au traitement et 3,7% dans la population traitée avec EPIDUO 0,1% / 2,5% gel par rapport au groupe véhicule (2,9%). En plus de ceux cités ci-dessus, d'autres effets indésirables ont été rapportés avec EPIDUO 0,1% / 2,5%, gel, l'association fixe précédemment approuvée d'adapalène et de peroxyde de benzoyle : Essais cliniques : D'autres effets indésirables rapportés lors des essais cliniques avec EPIDUO 0,1% / 2,5%, gel sont la dermite irritante de contact (fréquent) et brûlure à type coup de soleil (peu fréquent). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des

produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. Surdosage : EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel doit être appliqué par voie cutanée une fois par jour seulement. Une application excessive d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel peut provoquer une irritation sévère. Dans ce cas, cesser l'utilisation et attendre jusqu'à ce que la peau soit rétablie. En cas d'ingestion accidentelle, les mesures symptomatiques appropriées doivent être prises - **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES** - **Propriétés pharmacodynamiques** : Classe pharmacothérapeutique : préparations anti-acnéiques à usage topique, code ATC : D10AD53. Mécanisme d'action et Effets pharmacodynamiques : EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel associe deux substances actives, dont les mécanismes d'action sont différents mais complémentaires. *Adapalène* : l'adapalène est un dérivé de l'acide naphtoïque, chimiquement stable, d'activité type rétinoïde. Les études de son profil biochimique et pharmacologique ont démontré que l'adapalène a une action sur la pathologie de l'acné vulgaire : c'est un modulateur puissant de la différenciation cellulaire et de la kératinisation, et il a des propriétés anti-inflammatoires. Sur le plan du mécanisme d'action, l'adapalène se lie aux récepteurs nucléaires spécifiques de l'acide rétinoïde. Les preuves actuelles suggèrent que l'adapalène topique normalise la différenciation des cellules épithéliales folliculaires, entraînant une diminution de la formation de microcomédons. L'adapalène inhibe les réponses chimiotactiques (ciblées) et chimiocinétiques (non spécifiques) des leucocytes polymorphonucléaires humains, au cours de tests *in vitro* ; il inhibe aussi le métabolisme de l'acide arachidonique en médiateurs inflammatoires. Les études *in vitro* ont montré une inhibition des facteurs AP-1 et une inhibition de l'expression des récepteurs Toll-like 2. Ce profil suggère que la composante inflammatoire cellulaire dans l'acné est réduite par adapalène. *Peroxyde de benzoyle* : le peroxyde de benzoyle a montré une activité antimicrobienne, en particulier contre *Propionibacterium acnes*, qui est anormalement présent dans le follicule pilo-sébacé acnéique. Sur le plan du mécanisme d'action, le peroxyde de benzoyle a une activité fortement lipophile lui permettant de pénétrer à travers l'épiderme dans les membranes de cellules bactériennes et des kératinocytes du follicule pilo-sébacé. Le peroxyde de benzoyle est reconnu pour être un agent antibactérien à large spectre très efficace dans le traitement de l'acné vulgaire. Il a été démontré qu'il exerçait un effet bactéricide en générant des radicaux libres qui oxydent les protéines et les autres constituants cellulaires essentiels dans la paroi de la bactérie. La concentration minimale inhibitrice du peroxyde de benzoyle est bactéricide et a démontré son efficacité sur des souches de *P. acnes* sensibles et résistantes aux antibiotiques. En outre, le peroxyde de benzoyle a démontré des activités exfoliative et kératolytique. **Efficacité et sécurité clinique** : La sécurité et l'efficacité d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel appliquée une fois par jour dans le traitement de l'acné vulgaire ont été évaluées pendant 12 semaines, dans une étude clinique contrôlée, multicentrique, randomisée, en double aveugle comparant EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel au véhicule chez 503 patients atteints d'acné. Dans cette étude, 217 patients ont été traités avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel, 217 patients avec adapalène 0,1% / peroxyde de benzoyle 2,5% gel et 69 patients avec le véhicule. Les critères d'efficacité étaient : - Le taux de succès, défini comme le pourcentage de patients évalués comme « guéri » ou « presque guéri » à la 12ème semaine avec une amélioration d'au moins 2 grades sur l'échelle IGA (Investigator Global Assessment/Evaluation Globale par l'Investigateur). Un grade IGA « guéri » correspond à une peau guérie sans lésion inflammatoire ou non-inflammatoire. Un grade IGA « presque guéri » correspond à quelques comédons dispersés et quelques petites papules. - La différence absolue moyenne du nombre de lésions inflammatoires et non-inflammatoires à la 12ème semaine par rapport à l'inclusion. A l'inclusion, 50 % des patients avaient une sévérité d'acné évaluée comme « modérée » (IGA=3) et 50 % « sévère » (IGA=4). Dans la population globale de l'étude, un maximum de deux nodules était autorisé. Concernant le nombre de lésions, les patients avaient une moyenne de 98 lésions au totale (intervalle : 51-226), dont le nombre moyen de lésions inflammatoires était de 38 (intervalle: 20-99) et le nombre moyen de lésions non-inflammatoires était de 60 (intervalle: 30-149). L'âge des patients variait de 12 à 57 ans (âge moyen : 19,6 ans), avec 273 (54,3 %) des patients âgés de 12 à 17 ans. Un nombre similaire d'hommes (47,7 %) et les femmes (52,3 %) étaient inclus. Dans cette étude pivot, 55,2 % des patients évalués « sévère » avaient de l'acné sur le tronc. Les patients ont traité une fois par jour le visage et les autres zones atteintes d'acné sur le tronc. - Les analyses statistiques ont été réalisées pour comparer et interpréter les résultats de l'étude en deux étapes EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel vs véhicule dans la population globale de patients atteints d'acné modérée et sévère (IGA = 3 et IGA = 4). - EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel vs véhicule dans le sous-groupe de patients atteints d'acné sévère (IGA = 4). Les résultats d'efficacité sont présentés ci-après pour les populations combinées d'acné modérée et sévère. Tableau1 - Efficacité clinique à la semaine 12 dans la population globale : patients atteints d'acné vulgaire modérée et sévère (IGA combiné = 3 et 4, IM, population ITT).

Paramètres d'efficacité	EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel (N = 217)	Adapalène 0,1% / peroxyde de benzoyle 2,5%, gel (N = 217) ^a	Véhicule du gel (N = 69)
-------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------

Taux de succès (Amélioration minimum de 2 grades et IGA «guéri» ou «presque guéri»)	33,7% ^b	27,3%	11,0 %
Différence de lésions inflammatoires, Réduction absolue moyenne (pourcentage)	27,8 ^b (68,7 %)	26,5 (69,3%)	13,2 (39,2 %)
Différence de lésions non-inflammatoires, Réduction absolue moyenne (pourcentage)	40,5 ^b (68,3 %)	40,0 (68,0%)	19,7 (37,4 %)

IM = Imputation multiple; ITT = intention de traiter. a) Cette étude n'était pas conçue ou pas assez puissante pour comparer formellement l'efficacité d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel au plus faible dosage d'Adapalène 0,1 % / peroxyde de benzoyle 2,5%, ni pour comparer le plus faible dosage d'Adapalène 0,1 % / peroxyde de benzoyle 2,5% au véhicule. b) p < 0,001 vs véhicule. Les résultats des critères principaux d'efficacité dans la population d'acné sévère sont présentés dans le Tableau 2. Tableau 2 : Efficacité clinique chez les patients atteints d'acné vulgaire sévère (IGA = 4, IM, population ITT)

Paramètres d'efficacité	EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel (N = 106)	Adapalène 0,1% / peroxyde de benzoyle 2,5% Gel (N = 112)	Véhicule du gel (N = 34)
Taux de succès (Amélioration minimum de 2 grades et IGA «guéri» ou «presque guéri»)	31,9 % ^a	20,5%	11,8 %
Différence de lésions inflammatoires, Réduction absolue moyenne (pourcentage)	37,3 ^b (74,4 %)	30,2 (68%)	14,3 (33,0 %)
Différence de lésions non-inflammatoires, Réduction absolue moyenne (pourcentage)	46,3 ^b (72,1 %)	43,9 (68,4%)	17,8 (30,8 %)

IM = Imputation multiple; ITT = intention de traiter. a) p = 0,029 vs véhicule. b) p <0,001 vs véhicule. Le gel Adapalène 0,1% / peroxyde de benzoyle 2,5 % était inclus dans cet essai comme traitement de référence. Chez les patients évalués comme «modéré» (IGA=3), EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel n'a pas montré d'avantage en termes d'efficacité vs le traitement de référence. Dans l'analyse des patients évalués comme « sévère » (IGA=4), EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel a eu une plus grande efficacité versus véhicule avec une différence de traitement de 20,1 % (31,9% vs 11,8% ; IC à 95% : [6,0%, 34,2%]), p = 0,029), contrairement au traitement de référence (différence de traitement vs véhicule de 8,8 %). -

Propriétés pharmacocinétiques : Absorption : Une étude pharmacocinétique a été conduite avec EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel chez 26 sujets adultes et adolescents (12 à 33 ans) atteints d'acné vulgaire sévère. Pendant 4 semaines, les sujets étaient traités par 1 application quotidienne d'EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel en couche mince sur toutes les zones potentiellement atteintes (visage, épaules, poitrine et haut du dos) soit, en moyenne, 2,3 grammes / jour (intervalle : 1,6 -3,1 grammes / jour). Après 4 semaines de traitement, 16 sujets (62 %) présentaient des concentrations plasmatiques d'adapalène quantifiables supérieures à la limite de quantification (LoQ de 0,1 ng / ml), avec une C_{max} moyenne de 0,16 ± 0,08 ng / ml et une ASC_{0-24h} moyenne de 2,49 ± 1,21 ng.h / ml. Le sujet le plus exposé avait une C_{max} et une ASC_{0-24h} d'adapalène de 0,35 ng / ml et 6,41 ng.h / ml, respectivement. Les études pharmacocinétiques effectuées avec EPIDUO 0,1% / 2,5%, gel et EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel ont mis en évidence que l'absorption transdermique de l'adapalène n'est pas affectée par le peroxyde de benzoyle. La pénétration percutanée du peroxyde de benzoyle est faible. Lors d'une application cutanée, le peroxyde de benzoyle est complètement transformé en acide benzoïque qui est rapidement éliminé. Données de sécurité préclinique : Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité, phototoxicité ou cancérogénèse, n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme. Des études de toxicologie sur la reproduction ont été conduites avec l'adapalène par voie orale et cutanée chez le rat et le lapin. Un effet tératogène a été démontré à des doses systémiques élevées (doses orales de 25 mg/kg/jour). A des

expositions inférieures (dose cutanée de 6 mg/kg/jour), il a été observé une modification du nombre de côtes ou de vertèbres. Des études chez l'animal conduites avec EPIDUO 0,1% / 2,5%, gel ou EPIDUO 0,3% / 2,5%, gel comprenant des études de tolérance locale et des études de toxicologie en administrations cutanées répétées chez le rat, le chien et/ou le mini-porc jusqu'à 13 semaines, ont démontré une irritation locale et un potentiel sensibilisant, attendues pour une association contenant du peroxyde de benzoyle. L'exposition systémique à l'adapalène à la suite d'applications cutanées répétées de l'association fixe chez l'animal est très faible, ceci étant cohérent avec les données de pharmacocinétique clinique. Le peroxyde de benzoyle est rapidement et complètement transformé en acide benzoïque dans la peau, et après absorption est éliminé dans les urines, avec une exposition systémique limitée.

DONNEES PHARMACEUTIQUES - Durée de conservation : 2 ans. Après première ouverture : 3 mois. **Précautions particulières de conservation** : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. **Précautions particulières d'élimination et de manipulation** : Pas d'exigences particulières. - **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE** : Liste I - 30 g en récipient multidose avec système de fermeture sans entrée d'air muni d'un capuchon protecteur. N°AMM : 34009 300 811 3 6 - Non remb. Séc. Soc. Non agréé Coll. - **GALDERMA INTERNATIONAL** - TOUR EUROPLAZA – LA DEFENSE 4 - 20, AVENUE ANDRE PROTHIN - 92927 LA DEFENSE CEDEX – **DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE** : 23 AVRIL 2018