

## SPÉCIAL CARDIOLOGUES

# ESC Le temps de l'analyse

Rubrique dans le journal ou occasionnellement supplément distribué sur le lieu du congrès, les congrès hebdo s'attachent à parcourir durant l'année les grands congrès français, européens et américains, en mettant l'accent sur les thèmes chers aux médecins généralistes, les recommandations cliniques et les nouveautés présentées au congrès.

Date de bouclage :  
**lundi 28 octobre**

### Renseignements utiles

- Diffusion : 7 380 exemplaires

Adressez-nous votre projet d'annonce par mail : [pa@lequotidiendumedecin.fr](mailto:pa@lequotidiendumedecin.fr)

Vous recevrez le devis gratuit et sans engagement ainsi que la maquette de votre annonce.

Pour plus de renseignements, nous contacter :  
Tél. 01.73.28.13.11  
Fax. 01.73.28.13.10

**PARUTION : lundi 2 novembre 2015**

*Coordination : Pr Michel Galinier (Toulouse)*

### Le temps de l'analyse :

- Diagnostic de l'infarctus du myocarde par algorithme de 1<sup>re</sup> heure de la troponine I ultrasensible
- Résultats cliniques et angiographiques d'un stent biodégradable versus un stent actif métallique : Essai ABSORB Japan
- Prévention du remodelage ventriculaire gauche par stimulation après infarctus étendu
- Traitement de l'apnée du sommeil par ventilation servo-adaptée dans l'insuffisance cardiaque : Étude SERVE-HF
- Effets cardiovasculaires de la sitagliptine chez les patients diabétiques ce type 2 : Essai TECOS

### Etudes commentées :

- Mesure de la fraction de réserve coronaire lors du coroscanner (FFRCT) versus prise en charge habituelle chez des patients suspects de maladie coronaire: Essai PLATFORM
- Essai OPTIDUAL : clopidogrel 12 mois versus 48 mois après pose d'un stent
- Stent biodegradable versus stent métallique libérant de l'éverolimus infarctus du myocarde : résultats d'ABSORB STEMI TROFI II
- Blocage précoce de l'aldostéronone dans l'infarctus du myocarde : essai randomisé ALBATROSS
- Finerenone versus eplerenone dans l'insuffisance cardiaque chronique avec un diabète de type 2 et/ou une néphropathie chronique : essai ARTS-HF
- Télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque : Étude OptiLinkHF
- Evaluation du Lixisenatide chez des diabétiques de type 2 ayant eu un accident coronaire aigu : étude ELIXA
- Traitement optimal de l'HTA : Étude PATHWAY 2
- Traitement par diurétique seul ou en association : Étude PATHWAY 3

*Routage exclusif auprès de  
7 380 cardiologues*