

Nouveaux itinéraires de médecine générale

MALADIE CŒLIAQUE

Un rendez-vous
en 3 étapes

ÉTAPE 2

2

Maladie cœliaque : difficile à détecter, simple à diagnostiquer

avec le Pr Christophe Cellier, chef du service d'hépatogastroentérologie,
Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris


Conduite à tenir en cas de suspicion de maladie cœliaque

Suspicion
d'une
maladie
cœliaque

tTG IgA* + IgA totales

*Anticorps antitransglutaminase tissulaire de type IgA

Interprétation du résultat
des tests de biologie



Adresser le patient à un gastroentérologue

Confirmation d'une maladie
cœliaque par des techniques
complémentaires
(HLA, EMA, biopsie)
Mise en place mesures
adaptées (régime
sans gluten)*

Envisager un autre diagnostic

Rechercher d'autres causes
des symptômes



avec le Pr Christophe Cellier

* Un résultat positif en tTG IgA ou tTG IgG ne doit pas entraîner à lui seul l'arrêt du gluten dans l'alimentation.
Un RSG strict ne doit être mis en place qu'après confirmation d'une maladie cœliaque par un spécialiste.

À retrouver sur www.lequotidiendumedecin.fr**

** Disponible 1^{er} semestre 2016